Western 一抗二抗通用稀释液

Cat.No.: M3102　Size: 100 ml

描述：HaiGene 生产的 Western 一抗二抗通用稀释液用于做 Western blot 实验时一抗或者二抗的稀释。用本稀释液稀释的一抗或者二抗使用后，可放在 4℃或者-20℃保存，并且可以反复多次使用，节约您宝贵的抗体。按照每个一抗稀释 10ml 计算，该 Western 一抗稀释液可以稀释 10 个或 10 次 Western Blot 杂交实验。该制品中不含有抑制荧光显色或 HRP 显色的成分。

应用：Western blot 实验时一抗或者二抗的稀释

储存：-20℃　可保存 3 年。开始使用后请于 4℃保存，有效期为 1 年。

使用方法：

1. 进行一抗孵育杂交

参考所用的一抗说明书，以及样品中目的蛋白的含量，使用本抗体稀释液按照适当比例稀释一抗，如 1:1000、1:500 等，一抗稀释后即可直接用于 Western blot 实验（室温孵育杂交 1h 或 4℃杂交过夜）。实验结束后，可以回收稀释的一抗，4℃或-20℃　保存，以用于下次的 Western blot 实验。

2. 进行二抗孵育杂交

进行完一抗孵育后，TSBT 溶液洗涤膜 1~2 次，同样参考二抗说明书，使用本抗体稀释液，进行二抗的稀释，并进行二抗的孵育杂交（通常二抗杂交时间为室温 30min 即可）。杂交完毕后 TBST 洗涤膜 3~4 次，并进行下游显色。

注意：本产品仅供研究用，请勿用于人体及动物的治疗、临床诊断或作为食品、化妆品、家庭用品的添加剂等用途。