描述：DNA Marker 10000 是由 8 条双链 DNA 条带组成，适用于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 条带的分析。本产品为即用型产品，已含有 1XLoading Buffer, 可根据实验需要，直接取 5 μl 电泳，使用方便，电泳图像清晰。本产品中 8 条带分为 10,000、5,000、3,000、2,000、1,500、1,000、500 和 300 bp。

包装

名称	数量
DNA Marker 10000（50 次）	250 μl

应用：适用于衡量较大 PCR 片段的大小。

储存液组分：

10mM Tris-HCl(pH8.4)

10mM EDTA

0.02%溴酚蓝

5%甘油

储存：-20℃可保存 2 年，避免反复冻融。

使用方法

1.取 5 μl 本产品加入到琼脂糖凝胶的加样孔中(每 1mm 加样孔宽度加 1μl，如加样孔较宽，可适当增加上样量)进行电泳。

2.建议浓度为 0.8%的琼脂糖凝胶，电泳电压为 4-10 v/cm，电泳时间为 30-40 分钟。

3.通过 EB 染色，在紫外灯下观察电泳条带。



注意：本产品仅供研究用，请勿用于人体及动物的治疗、临床诊断或作为食品、化妆品、家庭用品的添加剂等用途。

描述：DNA Marker 10000 是由 8 条双链 DNA 条带组成，适用于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 条带的分析。本产品为即用型产品，已含有 1XLoading Buffer, 可根据实验需要，直接取 5 μl 电泳，使用方便，电泳图像清晰。本产品中 8 条带分为 10,000、5,000、3,000、2,000、1,500、1,000、500 和 300 bp。

包装

名称	数量
DNA Marker 10000（500 次）	250 μl×10

应用：适用于衡量较大 PCR 片段的大小。

储存液组分：

10mM Tris-HCl(pH8.4)

10mM EDTA

0.02%溴酚蓝

5%甘油

储存：-20℃可保存 2 年，避免反复冻融。

使用方法

1.取 5 μl 本产品加入到琼脂糖凝胶的加样孔中(每 1mm 加样孔宽度加 1μl，如加样孔较宽，可适当增加上样量)进行电泳。

2.建议浓度为 0.8%的琼脂糖凝胶，电泳电压为 4-10 v/cm，电泳时间为 30-40 分钟。

3.通过 EB 染色，在紫外灯下观察电泳条带。



注意：本产品仅供研究用，请勿用于人体及动物的治疗、临床诊断或作为食品、化妆品、家庭用品的添加剂等用途。